8R2s146-150
Kipridsky

Kipridsky
8 R 2 o . 146-150











CLOS 8 RANG 2 Souche 146-150

DESIGNATION : Kipridsky

CHARGE : Année :

Véraison : 4.8

Maturité : 12-9.88 8

Mill. : 0 Pour. : 0 +4

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 13

L - M - C

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 17x16

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 Avec pépins - apyrène

s2 1 JUS : inc. - coloré

s3

s4 4

s5 1

ANNEE 1988 mi

NOM Kipridsky bl EMPLACEMENT 8 R2 s 146-150

♀

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~1~~ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | f | | | | | | | | | | | |
| 3 | f | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 1.4 | 5.4 | 4 | 13 | 27.5 | 31.5 | 3.6 | 4.8 | 8.8 | 12.8 | 12.9 |
| ~~5~~ | | | | | | | | | | | | |

Pourriture : 0 Port : érigé Vigueur : 2 faible

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5.4 +12 | | | | 31,5 0 | | | +3 | | +4 |

ANNEE 1989

NOM Précoce d'Astrakan EMPLACEMENT 8 R3 s146-150

♀ mi

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8.3 | 13.3× | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 8.3 | 13.3× | 0 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 8.3 | 13.3× | 2 | 3,8 | | | | | | | |
| 4 | 4 | 8.3 | 13.3× | 4 | | 24.5 | 27.5 0 | 30.5 | 24.7 | 31,7 +2 | 10,8 | 28,8 +3 |
| 5 | 4 | 13,3 | 16.3× | 1 | | | | | | | | |

Pourriture : 0 Mill. : 5% Port : mi érigé Vigueur : 4

D le 13.3.89 -5

ANNEE 1989

NOM Kipridsky B      EMPLACEMENT 8 R2 s146-150

mi

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~1~~ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 20.3 | 23.3. | 4 | | | | | | | | |
| 3 f | | | | | 10 | 24.5 | 30.5 | 5.6 | 31.7 | 7,8 | 14,8 | 4,9 |
| 4 | 4 | 20.3 | 23.3. | 3 | | | +3 | | | +3 | | +4 |
| ~~5~~ | | | | | | | | | | | | |

Pourriture : 0     Mill. : 0     Port : érigé     Vigueur : 2

D le 23.3.89 +5

ANNEE 1990

NOM Kipridsky      EMPLACEMENT 8 R2 s 146-150

mi

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~1~~ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1,3 | 12.3. | 0 | | | | | | | | |
| 3 f | | | | | 0 | | | | | | | |
| 4 | 2 | 26.2 | 8.3. | 0 | | | | | | | | |
| ~~5~~ | D le 12.3.90 (+3) | | | | | | | | | | | |

Pourriture :     Mill. :     ~~Port~~ :     ~~Vigueur~~ :

ANNEE 1991

NOM Kipridsky mi

EMPLACEMENT 8 Rg 2 s 146-150

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~1~~ | | | | | 12 | 30.5 | 2.6 +2 | 4.6 | 13.8 | 20.8 +4 | 23.8 | 10.9 +4 |
| 2 | 2 | | | 4 | | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | | | | |

Grappe : G - (M) - P Dim : 17 Compacité : L - (M) - (C)

Pour : 0 Mill : 1

Baie : TG - G - (M) - P Dim: 15X14

disc-sph-(ell)-ov-obov-cyl-fus

Couleur : (B)-Gr-Rs-Rg-N ~~Jus~~ : inc - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : (avec) - apyrène

Port : érigé Vigueur : 1,5

N° d'ordre :

Désignation : Kipridsky

Emplacement : cl 8 R2s 146-150 (s-147)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - ~~sans~~ avec villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - ~~sans~~ avec villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 1e - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - ~~sans~~ avec villosité pubescente 282 - ~~sans~~ avec villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - ~~sans~~ avec villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 légt - duveteux 238 - cotonneux 239 - ~~sans~~ avec villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 87

N° d'ordre : Kipridsky
Désignation : 8 R 2
Emplacement : s.146-150 (s.147)

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.
Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.
ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.
Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.
ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.
Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. base
subcontinues - intermittentes.
très courte - courte - moyenne - longue - très longue.
Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

## ( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.
Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 87

Kiprideky

N° d'ordre :
Désignation : 8 R2o-146-150 (s.149)
Emplacement :

## FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - ~~sans~~ avec villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - ~~sans~~ avec villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

## PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Calvo 87

N° d'ordre : Kipridsky
Désignation : 8 R2s-146-150 (s.2)
Emplacement :

## GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 18 x ).
Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.
A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.
A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.
Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

## BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière assez - irrégulière (dimensions 19 x 18).
De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.
Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.
Coloration régulière - irrégulière.
Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.
A jus incolore 105 - coloré 106.
A ombilic très apparent - peu apparent.
A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.
Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.
A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.
De séparation facile (égreneuse) - difficile.
A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.
A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.
A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.
A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.
A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.
A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.
A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.
A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.
Avec pépins - apyrène.

Calvo 87

DENOMINATION : Kipridsky

EMPLACEMENT : 8 R2 S 146-150 (s.1)

(un peu faible)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .......7.... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 88

N° d'ordre :
Désignation : Kipridsky
Emplacement : 8 K2 s 148-150

| | |
|---|---|
| Angle des nervures | : 1 - (2) - (3) |
| Sexe | : 4 - 5 - (6) |
| $L_1/L_2$ | : 7 - (8) - 9 |
| $L_2/L$ | : (10) - 11 |
| Nombre de lobes | : (12) - (13) - (14) - 15 - 16 |
| Prof. sinus latéral Sup. | : (17) - (18) - (19) - 20 |
| Prof. sinus latéral Inf. | : (21) - (22) - 23 - 24 |
| Forme sinus pétiolaire | : 25 - 26 - 27 - (28) - 29 |
| Fond sinus pét. ni en U ni en V | : (266) |
| Sinus pétiolaire ouvert | : 267 |
| Dent au fond du sinus pétiolaire | : 30 |
| Forme sinus latéral Sup. | : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- (39) |
| Fond sinus latéral Sup. en V | : (268) - en U : 269 - autre : 270 |
| Sinus latéral Supérieur ouvert | : (271) |
| Dents : forme | : (40) - 41 |
| Dents (angle) | : 42 - 43 - (44) |
| Angle du lobe terminal | : (45) - (46) - 47 |
| Sinus pét.(dégar.- gar.-1/2 dégar.) | : 48 - (49) - 50 |
| Nbre dents du point pét. à $L_3$ | : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58- 59 |
| Angle des nervures $L_3$ $L'_3$ | : 60 - 61 - (62) |
| Largeur du sinus pétiolaire | : 63 - 64 - (65) - (66) - (67) |

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90